



	โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที่ 1 จากจำนวน 3 หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
	ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM - 053	แก้ไขครั้งที่ : 00
	เรื่อง : เกณฑ์การสอบสวนโรคมือเท้าปากในเขตอำเภอวังสะพุง	
	ผู้จัดทำ : นางสาวสุदानันท์ นามบุตร	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุदानันท์ นามบุตร) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุภาวดี ฝวกสม) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้อนุมัติ
 (นายรณรงค์ ศรีพล) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

	โรงพยาบาลวังสะพุง	หน้าที่ 2 จากจำนวน 3 หน้า ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
	ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM – 053	แก้ไขครั้งที่ : 00
	เรื่อง : เกณฑ์การสอบสวนโรคมือเท้าปากในเขตอำเภอวังสะพุง	
	ผู้จัดทำ : นางสาวสุดานันท์ นามบุตร	ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตรวจจับ คัดกรอง ผู้สงสัยโรคมือเท้า ปาก เพื่อการส่งต่อรักษาพยาบาล รักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

1.2 เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการเสียชีวิตจากโรคมือเท้า ปาก

1.3 เพื่อสามารถเป็นแนวทางตรวจจับการระบาดของโรคมือเท้า ปาก ในพื้นที่ เพื่อการควบคุมป้องกันโรค อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

2. ขอบเขต : แนวทางปฏิบัตินี้ใช้ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่อำเภอวังสะพุง

3. ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ทุกระดับในพื้นที่อำเภอวังสะพุง

4. นิยาม : โรคมือเท้าปาก มีอาการดังนี้ มีตุ่มใส หรือแผลร้อนในเกิดขึ้น หลายแผลในปาก และมีอาการเจ็บ มีผื่นแดงหรือตุ่มใส ขนาดเล็กที่บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า หรือก้น และมีอาการไข้เป็นระยะเวลา ๕ - ๗ วัน

5. วิธีปฏิบัติ

แนวทางการสอบสวนโรคมือเท้าปาก ขึ้นตอนตาม flow chart

6. เอกสารอ้างอิง

-

7. ภาคผนวก :



โรงพยาบาลวังสะพุง

หน้าที่ 3 จากจำนวน 3 หน้า
ฉบับที่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ระเบียบปฏิบัติที่ : WP - HPP- FAM - 053

แก้ไขครั้งที่ : 00

เรื่อง : เกณฑ์การสอบสวนโรคมือเท้าปากในเขตอำเภอวังสะพุง


ผู้จัดทำ : นางสาวสุตานันท์ นามบุตร

ผู้อนุมัติใช้ : นายรณรงค์ ศรีพล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง

อาการโรค Hand foot mouth
มีไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับมีอาการแสดง อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- เบื่ออาหาร
- เจ็บปาก
- มีผื่นแดงและพองใสที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม มือ เท้า
- อาเจียน
- ท้องเสีย
- หอบเหนื่อย



ถ้าพบผู้ป่วยในห้องเรียนเดียวกันมากกว่า 2 ราย ภายใน 1 สัปดาห์ อาจพิจารณาปิดห้องเรียน แต่ถ้ามีผู้ป่วยมากกว่า 1 ห้อง อาจปิดศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน/สถานที่ศึกษาชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน ทำการ เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆที่เด็กป่วยสัมผัส